Dois dos sinais que se seguem: Letárgica ou inconsciente. Olhos fundos. Não consegue beber ou bebe muito mal. Sinal da Prega: a pele volta muito lentamente ao estado anterior.	DESIDRATAÇÃO GRAVE	 Se a criança não se enquadrar em nenhuma outra classificação grave: Iniciar Terapia Endovenosa (Plano C) OU Se a criança também se enquadrar em outra classificação grave: Referir URGENTEMENTE ao hospital, com a mãe administrando-lhes goles freqüentes de SRO durante o trajeto. Recomendar à mãe a continuar a amamentação ao peito. Se a criança tiver 2 ou mais anos de idade, e se houver cólera na sua região,
Dois dos sinais que se seguem: Inquieta, irritada. Olhos fundos. Bebe avidamente, com sede. Sinal da prega: a pele volta lentamente ao estado anterior.	DESIDRATAÇÃO	administrar antibiótico contra a cólera. > Administrar SRO no Serviço de Saúde (PlanoB) > Se a criança também se enquadrar em uma classificação grave devido a outro problema: - Referir URGENTEMENTE ao hospital com a mãe administrando-lhe goles freqüentes de SRO durante o trajeto. - Recomendar à mãe continuar a amamentação ao peito. > Informar à mãe sobre quando retornar imediatamente. > Seguimento em cinco dias se não melhorar.
Não há sinais suficientes para classificar como desidratação ou desidratação grave.	SEM DESIDRATAÇÃO	 Dar alimentos e líquidos para tratar a diarréia em casa (Plano A). Informar à mãe sobre quando retornar imediatamente. Seguimento em cinco dias se não melhorar.