

Como parte das estratégias utilizadas para a redução da transmissão vertical da sífilis na gravidez, os laboratórios da rede municipal de saúde que realizam o exame de triagem para sífilis (VDRL) realizam simultaneamente o exame confirmatório para sífilis (teste treponêmico Bioeasy) sempre que o resultado do VDRL for igual ou inferior a 1/8, ou seja, 1/1, 1/2, 1/4 e 1/8.

Tal medida visa qualificar o diagnóstico da sífilis em mulheres com títulos baixos de VDRL, pois se sabe que a gravidez pode propiciar o surgimento de resultados falso-positivos.

Ressaltamos que uma gestante com VDRL com título baixo e teste confirmatório positivo pode ter uma infecção recente com títulos ascendentes, uma infecção antiga não tratada, ou uma infecção antiga tratada (cicatriz sorológica). Lembramos que o teste confirmatório não se torna negativo após o tratamento correto da doença e que apenas uma anamnese adequada poderá diferenciar essas três situações, que implicarão em condutas distintas.

Caso a gestante **não tenha história de tratamento documentada, ela deverá ser tratada novamente** com o esquema terapêutico mais adequado para o estágio da doença, a saber:

- Sífilis primária – penicilina G benzatina 2.400.000 UI/IM (1.200.00 UI aplicado em cada glúteo), em dose única;
- Sífilis secundária ou sífilis assintomática com menos de um ano de evolução (latente recente) – duas séries de penicilina benzatina 2.400.000 UI/IM (1.200.00 UI aplicado em cada glúteo), com intervalo de uma semana entre elas (dose total 4.800.00UI);
- Sífilis terciária ou sífilis assintomática com mais de um ano de evolução (latente tardia) ou **COM DURAÇÃO IGNORADA** – três séries de penicilina benzatina 2.400.000 UI/IM (1.200.00 UI aplicado em cada glúteo), com intervalo de uma semana entre elas (dose total 7.200.000UI).

Solicitamos ampla divulgação aos profissionais que atuam na assistência pré-natal em sua unidade e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se torne necessário.

Atenciosamente,

Lílian de Mello Lauria
Gerente do Programa de DST/Aids